EUCALIPTOL, GOMENOLY ACEITE DE VASELINA: GOTAS NASALES

INFORMACIÓN AL PACIENTE

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

FORMA FARMACÉUTICA:

DOSIS UNITARIA:

NÚMERO DE DOSIS:

INDICACIONES: Gotas nasales con acción descongestiva y antiséptica indicadas en rinitis, rinofaringitis, sinusitis, coriza o resfriado común. Si el preparado contiene **resorcina** le confiere, además, acción queratoplástica y refuerza la acción antiséptica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Nasal.

POSOLOGÍA: **Según indicación médica.**

Posología USUAL y NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Siga estrictamente las dosis y pautas (modo de empleo y duración del tratamiento) indicadas por su médico. Antes de utilizar éste preparado suénese suavemente y durante la aplicación respire por la boca; incline la cabeza hacia atrás y procure que el cuentagotas no toque el orificio nasal; tape con un dedo el otro orificio nasal mediante presión lateral; sin inspirar apriete la pera del cuentagotas con el fin de instilar el número exacto de gotas prescritas por su médico; inspire ligeramente, sin provocar el paso del líquido a la garganta; repita el procedimiento en el otro orificio nasal; mantenga la cabeza inclinada hacia atrás durante unos minutos y respire por la boca, procurando no sonarse durante éste tiempo; tras la administración es posible que note el sabor del preparado (esto es normal); no comparta con nadie el cuentagotas. Salvo distinto criterio médico la posología usual es: **Adultos**, 1-2 gotas en cada fosa nasal 4-6 veces al día. **Niños**, 1 gota en cada fosa nasal 4-6 veces al día. Si el preparado contiene **resorcina y/o adrenalina**, antes de utilizarlo, agitar fuertemente el envase.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Niños menores de 2 años. No es aconsejable su aplicación sobre heridas abiertas. Si la fórmula contiene **adrenalina** el preparado está contraindicado en

EUCALIPTOL, GOMENOLY ACEITE DE VASELINA: GOTAS NASALES

INFORMACIÓN AL PACIENTE

pacientes hipersensibles a los agentes simpaticomiméticos, así como en enfermedad arterial coronaria o cardíaca, hipertensión, hipertiroidismo, hiperexcitabilidad, feocromocitoma y glaucoma de ángulo cerrado; y deberá realizarse especial control médico en embarazo, lactancia, niños y ancianos.

EFECTOS SECUNDARIOS: Picor, sequedad, sensación de quemazón de la mucosa nasal. Su uso continuado o excesivo puede producir congestión de rebote y pérdida de efecto, así como inhibir el movimiento ciliar y ocasionar neumonía lipídica. Si contiene **adrenalina** y se produce suficiente absorción sistémica puede dar lugar a crisis hipertensivas si se usa junto con IMAO o antidepresivos tricíclicos.

CONSERVACIÓN:

Conservar en ambiente seco y fresco.
Proteger del calor y luz directa.
Mantener el envase bien cerrado y lejos del alcance de los niños.

CADUCIDAD ESTIMADA: 3 meses.

SOBREDOSIS:

La intoxicación por éste medicamento, a las dosis recomendadas, es improbable.
En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir a un centro médico, indicando el producto y la cantidad ingerida o consultar en INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 91-5620420 (24 horas).

NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA FARMACIA DISPENSADORA:

.....
.....
.....

ANTES DE USAR SU MEDICACIÓN, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO SI:

- Tiene dudas en cuanto a la dosis o pauta de administración.
- Está tomando otros medicamentos (también anticonceptivos orales).
- Es alérgico a algún medicamento o sustancia.
- Padece alguna enfermedad crónica: diabetes; hipertensión; úlcera gastroduodenal; glaucoma; epilepsia; insuficiencia hepática, renal, cardíaca o respiratoria; etc.
- Está embarazada o podría estarlo.
- Está en periodo de lactancia.
- Desea información sobre efectos secundarios, contraindicaciones o cualquier otra cuestión relacionada con su tratamiento.